

Tanaris[®]

Tweemaal raak tegen onkruiden

- Combinatie van twee belangrijke actieve stoffen
- Dubbele werking: bodem en blad
- Aanvullend en versterkend effect van het FAR systeem

www.agro.basf.be

 **BASF**
We create chemistry




Tanaris® Combinatie van twee belangrijke actieve stoffen

Tanaris® combineert dimethenamid-P en quinmerac, twee belangrijke actieve stoffen bij de onkruidbestrijding in bieten.

Werkzame stof	Doel onkruiden in het FAR systeem
Dimethenamide-P	Klassieke flora + hondspeterselie, zwarte nachtschade, bingelkruid, melganzenvoet en hanenpoot
Quinmerac	Hondspeterselie, ereprijs, klapproos, kleeftkruid, dovenetel

Tanaris® Dubbele werking: bodem en blad

Tanaris® werkt via de bovengrondse delen (opname via de bladeren) en via de bodem (opname door de wortels en door het hypocotiel voor de tweezaadlobbige onkruiden en door het coleoptiel voor de grasachtige onkruiden).



De kracht van **Tanaris®** zit in een betere betrouwbaarheid dankzij:


- verschillende ingangspunten in het onkruid
- twee verschillende werkingswijzen:
 - dimethenamide-P stopt de celdeling door een effect op de vetzuursynthese (HRAC-classificatie: groep K3, chlooracetamide)
 - quinmerac veroorzaakt groei problemen door het verstoren van de auxinewerking (HRAC-classificatie: groep O, quinoleinecarboxylzuur)

In bieten past **Tanaris®** perfect in het FAR systeem waarbij het de werking op de meeste onkruiden aanvult en versterkt.

- 1- Akkerereprijs
- 2- Akkerviooltje
- 3- Amarant
- 4- Bingelkruid
- 5- Duivenkervel
- 6- Groot akkerscherm
- 7- Grote ereprijs
- 8- Hanenpoot
- 9- Herderstasje

- 10- Herik
- 11- Hoenderbeet
- 12- Hondspeterselie
- 13- Kamille
- 14- Klaproos
- 15- Kleefkruid
- 16- Klein kruiskruid
- 17- Klimopereprijs
- 18- Koolzaad

- 19- Melganzenvoet
- 20- Paarse dovenetel
- 21- Perzikkruid
- 22- Straatgras
- 23- Varkensgras
- 24- Vergeet-me-nietje
- 25- Vogelmuur
- 26- Zwaluwtong




Na-opkomst:
3 FAR behandelingen

Na-opkomst:
3 FAR behandelingen met **Tanaris®**
(FAR 1: +0,3 l/ha **Tanaris®**; FAR 2: +0,6 l/ha **Tanaris®**; FAR 3: +0,6 l/ha **Tanaris®**)


Werking (%) – Europese proeven

De toevoeging van **Tanaris®** in het FAR systeem is vooral opmerkelijk tegen schermbloemigen (hondspeterselie, groot akkerscherm), amarant, bingelkruid, duivenkervel, ereprijs, hanenpoot, hoenderbeet, kamille, kleefkruid, melganzenvoet en zwarte nachtschade.



Tanaris® Dubbel zo sterk tegen schermbloemigen


Dimethenamide-P en quinmerac de 2 actieve stoffen uit **Tanaris®** hebben elk een andere werkwijze tegen schermbloemigen waarmee ze nog steeds in na-opkomst met het FAR systeem kunnen bestreden worden.



BASF proef - Mignault 2019. Ingezaaide onkruiden, o.a. schermbloemigen (groot akkerscherm)

Tanaris® Positionering in suikerbiet en voederbiet

Tanaris® integreert zich in het klassieke FAR systeem vanaf het 2 bladstadium van de bieten.



Bufferzone: het etiket van het product en de regionale regelgeving raadplegen.
Tanaris®: maximum 3 toepassingen (één in het 2 bladstadium en één tot twee tussen het 4 en 8 bladstadium) en maximum 1,5 l/ha/36 maanden. Max. 1.000 g dimethenamide-P/ha/jaar. Max. 250 g quinmerac/ha/jaar.