

# Revysol® : fiable

L'utilisation des fongicides à base de **Revysol®** minimise les risques liés aux conditions climatiques défavorables.

## Même en cas de pluie, de températures fraîches ou de rayonnements UV élevés

Les températures inférieures à 13°C limitent généralement l'absorption des produits. Bénéficiant des formulations haute technologie (**Stick & Stay**) développées par BASF, les fongicides à base de **Revysol®** sont fixés et absorbés rapidement, avec comme résultat, des performances élevées indépendamment de la température au moment de l'application.

De plus, la formation de réservoirs de molécules de **Revysol®** à l'intérieur de la plante protège la matière active des facteurs externes tels que la pluie et le soleil.


En effet, les tests réalisés par un institut indépendant montrent que les fongicides à base de **Revysol®** sont rapidement à l'abri du lessivage et conservent une excellente efficacité même en cas de pluie après l'application.

Concernant la résistance aux rayonnements solaires, nos tests ont prouvé que **Revysol®** est nettement moins dégradé par les UV que la référence triazole.

Tout cela explique l'excellente efficacité et la longue durée de protection assurée par les fongicides à base de **Revysol®**.




Efficacité (%) contre septoriose en conditions sèches ou humides après l'application



Essai au champ – Institut de recherche indépendant Irlandais ADAS (Agriculture Development and Advisory Service). Produits appliqués en T2 à 80 % de la dose agréée. Association **Revysol®-Xemium®** utilisée dans l'essai : **Revystar® Gold**. Pluie artificielle par irrigation 15 minutes après le traitement. Apport d'eau total de 6,5 mm sur une période d'une heure. 

Contrairement aux meilleures références actuelles, **Revysol®** présente des performances élevées et fiables en conditions sèches ou en cas pluie peu de temps après le traitement, ou de température basse au moment de l'application.

Efficacité (%) contre septoriose en fonction de la température au moment de l'application



Essais (n=294) BASF réalisés en froment de 2013 à 2016 en Europe. Produits appliqués à dose pleine. Produit **Revysol®** utilisé dans l'essai : **Lenvyor®**. Observations 21 à 61 jours après le dernier traitement. Attaque moyenne de septoriose dans les témoins : 57%.