

Revysol® : facile

20 juin

Une excellente curativité et une longue durée de protection

Grâce à l'excellente action curative de **Revysol®** notamment contre la septoriose et à sa durée de protection supérieure, les parcelles traitées avec **Revysol®** restent plus saines et plus vertes plus longtemps avec comme résultat un rendement nettement supérieur.

1^{er} juillet

Comparaison au champ d'un traitement unifié



Témoin



Gain de rendement par rapport au témoin :



Essai BASF – Mignault 2019 – Variété : Henrik. Photos prises 30 jours (20/06) ou 41 jours (01/07) après le dernier traitement.
Premier traitement au stade 2^{ème} nœud (BBCH 32) le 22/04 et deuxième traitement au stade dernière feuille (BBCH 39) le 21/05.
Produits appliqués à dose pleine. Produit **Revysol®** utilisé dans l'essai : **Lenvyor®**.

quement à base d'époxiconazole ou de **Revysol®**.



*Traitement uniquement
à base d'époxiconazole*



*Traitement uniquement
à base de **Revysol®***



+ 859 kg/ha




+ 2.353 kg/ha

Revysol® : facile

Plus de flexibilité d'utilisation

Revysol® offre une plus large fenêtre d'application et facilite la gestion des pulvérisations.

Efficacité (%) contre septoriose




Essai au champ – Institut de recherche indépendant Irlandais ADAS (Agriculture Development and Advisory Service) – 2017
Produits appliqués à dose pleine. Produit **Revysol®** utilisé dans l'essai : **Lenvyor®**. Observations au 22 juin.



Par rapport aux fongicides actuels, **Revysol®** permet de traiter, si nécessaire :

- ➔ un peu plus tôt et de bénéficier de sa rémanence;
- ➔ ou un peu plus tard et de profiter de son action curative supérieure contre la septoriose.

Phases de développement de la septoriose



Zymoseptoria tritici (septoriose)

Action préventive


Action curative



Application des fongicides au stade de développement "hyphe sous-épidermique" du champignon (9 jours après la germination des spores).



Non traité



Référence triazole



Revysol®

Coupe intérieure d'une feuille de blé inoculée avec *Zymoseptoria tritici*. Essai en serre par Julie Smith, ADAS. Images prises 18 jours après l'infection, par microscope électronique à balayage par Smitta Kurup et Rebecca De Vos, Rothamsted Research. Produits appliqués à dose pleine. Produit **Revysol®** utilisé dans l'essai: **Lenvyor®**.

Contre la septoriose, l'excellente action curative de **Revysol®** laisse plus de temps pour intervenir et permet une meilleure gestion et planification des traitements.