

Denk aan de groeiregulatie van koolzaad met Caryx® !


Met de huidige en aangekondigde zachte temperaturen, ontwaakt het koolzaad uit zijn winterslaap en zal de groei snel en aan een hoog tempo hernemen.

Caryx® wordt toegepast vanaf het stadium verlenging internodiën zichtbaar tot bloemknoppen komen voorbij jongste bladeren en maakt het mogelijk om:

- **Legering** zeer efficiënt tegen te gaan
- Een groter aantal **secundaire takken en hauwen** te laten ontwikkelen
- Een **homogenere afrijping** te verwezenlijken en zo de oogst te vereenvoudigen en te optimaliseren.



Verlenging internodiën
zichtbaar (C2)



bloemknoppen komen
voorbij jongste bladeren (D2)

Indien **Caryx®** reeds voor de winter werd ingezet, maximaal 0,7 l/ha in het voorjaar gebruiken. Maximale totale dosis is 1,4 l/ha/teelt.

Caryx® is compatibel met insecticiden en verschillende bladmeststoffen.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met
Dirk Butaye (0485/84.25.09) of Michiel Hubau (0473/97.47.87)

**Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**

Caryx® (8771P/B) bevat 210 g/l mepiquatchloride en 30 g/l metconazool.