

Delan® 70 WG

Fongicide de contact en arboriculture fruitière, houblon, rosiers et vignes

Contactfungicide in de fruitteelt, hop, rozelaars en wijnbouw

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette
Raadpleeg steeds de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket

Numéro de lot et date de production : voir emballage

Lotnummer en productiedatum: zie verpakking
Chargennummer und Produktionsdatum: siehe Verpackung

N° d'autorisation: 8850P/B

Usage professionnel

(G.-D. Lux.: L 01444-042)

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Contient:

70 % de dithianon

Toelatingsnummer: 8850P/B

Bereidsgebruik

(G.-D. Lux.: L 01444-042)

Water dispergeerbaar granulaat (WG)

Bevat:

70 % dithianon

Zulassungsnummer: 8850P/B

Berufliche Anwendung

(G.-D. Lux.: L 01444-042)

Wasserdispersierbares Granulat (WG)

Enthält:

70 % Dithianon

Mode d'action / Werkingswijze /
Wirkungsmechanismus

Group	M09	Fungicide

Distribué par / Verdeeld door / Vertriebt durch:
BASF Belgium Coordination Center CommV
B. U. Agricultural Solutions
www.agro.basf.be

SIEGE D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEZETEL
/ OPERATIVER HAUPTSITZ:
Drève Richelle 161 E bte 43
1410 Waterloo, Belgium
Tel.: +32 (0)2 373.27.23

Renseignements en cas d'urgence /

Alarmnummer / Notrufnummer:

tel.: +32 (0) 3 569 92 32

Centre Antipoisons / Antigifcentrum /

Giftoptionszentrum:

Belgium tel.: +32 (0) 70 245 245

G.-D. De Luxembourg tel.: +352 (0) 8002 5500

Détenteur d'autorisation / Toelatingshouder /

Zulassungsinhaber:

BASF Belgium Coordination Center CommV

SIEGE SOCIAL / MAATSCHAPPELJKE ZETEL

/ FIRMENSITZ:

Schedelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Mentions de danger:

EUH401 Respectez les instructions

d'utilisation pour éviter les risques pour la

santé humaine et l'environnement.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets néfastes

à long terme.

Conseils de Prudence (Prévention):

P280 Porter des gants de protection, des

vêtements de protection, un équipement de

protection des yeux et du visage.

Conseils de Prudence (Intervention):

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/

un médecin.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU: laver abondamment à l'eau et

au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX: rincer avec précaution

à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime

en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou

suspectée: consulter un médecin.

P330 Rincer la bouche.

P391 Recueillir le produit répandu.

Gevaarssindicaties:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om

gevaar voor de menselijke gezondheid en het

milieu te voorkomen.

H301 Giftig bij inslikken.

H317 Kan een allergische huidreactie

veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstige oogletsels.

H351 Verdacht van het veroorzaken van

kanker.

H410 Zeer giftig voor in het water levende

organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (Preventie):

P280 Beschermende handschoenen,

beschermende kleding, oogbescherming en

gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsverklaringen (Respons):

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID:

met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE

OGEN: voorzichtig afdropelen met water,

gedurende een aantal minuten contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: eeri

arts raadplegen.

P330 De mond spoelen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gefahrenhinweise:

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für

Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung

einhalten.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen

verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit

langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,

Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER

HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe




hinzuziehen.

P330 Mund ausspülen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.



Comment mettre
une formulation WG
dans la cuve /
Hoe WG formuleren
in spuittank brengen?



Quel produit d'abord
dans la cuve /
Welk product eerst in
spuittank brengen: WG, SG,
WP, SC, CS, SL, SE, EC, ME.

**DANGER
GEVAAR
GEFAHR**



5 kg

Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen

Nom commercial / Handelsbenaming: Delan® 70 WG

N° d'autorisation / Toelatingsnummer: 8850P/B (G.-D. Lux. / G.H. Lux.: L 01444-042)

Substance active / Werkzame stof: 70 % de dithianon / 70 % dithianon

Mentions de danger / Gevaarsindicaties: GHS05 – GHS06 – GHS08 – GHS09 – H301 – H317 – H318 – H351 – H410 – EUH401

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P301 P330 P310	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler immédiatement le numéro d'urgence 112.	NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.
P304 P340 P312	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.	NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 P362 P352 P333+P313 P272 P363	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305 P351+P338 P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. NE PAS faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Remarques pour le médecin / Opmerkingen voor de arts:

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum:

Belgium tel.: +32 (0) 70 245 245 – G.-D. De Luxembourg tel.: +352 (0) 8002 5500

Mode d'emploi

Pommiers (plein air)

Durant les vols d'ascospores

Contre la tavelure du pommier (*Venturia inaequalis*).

Préventivement, selon les avertissements à la **dose** de 0,5 kg/ha de haie fruitière (ou 0,75 kg/ha de verger standard).

Vu la légère augmentation de la rugosité, le **Delan® 70 WG** appliqué sur les pommiers à peau lisse (Golden delicious) sera remplacé par un autre fongicide pendant la période allant du stade G (bouton rose) au stade N (fin de la chute des fruits).

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Durant la période d'été

Delan® 70 WG peut être utilisé contre la tavelure (conidies) durant la période d'été (après une lutte réussie contre les ascospores) à la **dose** de 0,23 kg/ha de haie fruitière (0,35 kg/ha de verger type) avec des intervalles de 7 à 10 jours.

Délai avant récolte: 28 jours.

Maximum 6 applications/12 mois.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Poiriers (plein air)

Contre la tavelure du poirier (*Venturia pirina*).

Préventivement, selon les avertissements à la **dose** de 0,5 kg/ha de haie fruitière (ou 0,75 kg/ha de verger standard).

Délai avant récolte: 28 jours.

Maximum 6 applications/12 mois.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Cerisiers et griottiers (plein air)

Contre la cylindrosporiose/anthracnose (*Blumeriella jaapii / Cyclindrosporium padi*), préventivement et régulièrement après la floraison avec des intervalles d'environ 10 jours.

– Arbres basses tiges : 700 g/ha de haie fruitière (1 kg/ha de verger standard).

– Arbres hautes tiges : 70 g/100 L.

Délai avant récolte: 28 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Houblon (plein air)

Pour lutter contre le mildiou du houblon (*Pseudoperonospora humili*).

Dose: 0,05 % (= 50 g/100 L d'eau), à appliquer préventivement tous les 7 à 10 jours.

Délai avant récolte: 28 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Rosiers (plein air et sous protection) (non destinés à la consommation)

Pour combattre la maladie des taches noires du rosier (*Diplocarpon rosae*).

Dose: 75 g/100 L d'eau à appliquer tous les 7 à 10 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air).

Vignes (pour production de vin)(plein air)

Contre le rougeot parasitaire (*Pseudopeziza tracheiphila*), le mildiou de la vigne (*Plasmopara viticola*), et l'excoriose (*Phomopsis viticola*).

Dose : 0,4 kg/ha de haie, 1 application.

Remarque : max. 1 application/12 mois.

Délai avant récolte : 48 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air).

Usages agréés mais non testés par BASF, pour lesquels l'utilisation se fera sous la responsabilité de l'utilisateur. BASF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de problèmes.

Pêchers, nectariniers et abricotiers (plein air)

Pour lutter contre la tavelure (*Venturia carpophila*)

Dose: 0,5 kg/ha de haie (0,9 kg/ha verger standard), 1 – 2 applications.

Pour lutter contre maladie criblée (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*)

Dose: 0,7 kg/ha de haie (1,26 kg/ha verger standard), 1 – 2 applications.

Délai avant récolte: 28 jours.

Remarque: max. 3 applications/12 mois.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Pour lutter contre cloque du pêcher (*Taphrina deformans*)

Stade d'application: développement des premières feuilles – début de la croissance des pousses, l'axe de la pousse devient visible (BBCH 10-31).

Dose: 0,5 kg/ha de haie (0,9 kg/ha verger standard), 1 – 3 applications à intervalle de 10 – 14 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Carottes (plein air)

Contre l'alternariose, brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*).

Dose: 1,8 kg/ha, à raison de 3 applications (tous les 7 à 10 jours), dès l'apparition de la maladie.

Délai avant récolte: 14 jours.

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Groseilliers (blancs, rouges et cassis) et groseilliers à maquereau et hybrides (plein air)(sous protection)

Stade d'application: avant la floraison et/ou après la cueillette.

Pour lutter contre anthracnose du groseillier (*Drepanopeziza ribis*).

Dose: 0,7 kg kg/ha de haie, 2 – 3 applications à intervalle de 7 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air).

Airelles canneberges (plein air)(sous protection)

Stade d'application: avant la floraison et/ou après la cueillette.

Pour lutter contre anthracnose du groseillier (*Drepanopeziza ribis*).

Dose: 0,7 kg kg/ha de haie, 2 – 3 applications à intervalle de 7 jours.

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique (plein air).

Ronces (mûres) et framboisiers (plein air)(sous protection)

Pour lutter contre la brûlure des dards (*Didymella applanata*, ...), la rouille noire des ronces (*Phragmidium violaceum*) et la rouille du framboisier (*Phragmidium rubi-idaei*).

Dose: 0,7 kg kg/ha de haie, 1 – 3 applications.

Remarque: max. 3 applications/12 mois.

Délai avant récolte: 14 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air).

Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (plein air)(sous protection)

Pour lutter contre la cylindrosporiose (*Cylindrosporium*), le mildiou des plantes ornementales (*Phytophthora spp./ Peronospora spp.*), la tavelure (*Venturia Sphilocaea*), les rouilles (*Puccinia, Uromyces, Phragmidium...*) et la maladie criblée (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*).

Dose : 75 g/100 l, 1 – 3 applications.

Remarque : max. 3 applications/12 mois.

Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: Buxus, Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air).

Uniquement pour le Grand-Duché de Luxembourg

Nectarines (plein air)

Pour lutter contre la tavelure (*Venturia carpophila*)

Dose: 0,5 kg/ha de haie (0,9 kg/ha verger standard), 1 – 2 applications.

Pour lutter contre maladie criblée (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*)

Dose: 0,7 kg/ha de haie (1,26 kg/ha verger standard), 1 – 2 applications.

Délai avant récolte: 28 jours.

Remarque: max. 3 applications/12 mois.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Pour lutter contre cloque du pêcher (*Taphrina deformans*)

Stade d'application : développement des premières feuilles – début de la croissance des pousses, l'axe de la pousse devient visible (BBCH 10-31).

Dose: 0,5 kg/ha de haie (0,9 kg/ha verger standard), 1 – 3 applications à intervalle de 10 – 14 jours.

Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

Prunier (plein air)

Pour lutter contre la rouille du prunier et la tavelure à la dose de 0,05 kg/hL. Maximum 2 applications.

Délai avant récolte: 28 jours.

Cerisiers et griottiers (plein air)

Pour lutter contre la tavelure du cerisier à la dose de 0,25 kg/ha dès l'apparition des premiers organismes nuisibles ou symptômes. Appliquer à des intervalles de 10 à 14 jours.

Remarque: dosage kg/ha et m hauteur dans maximale 500L/ha d'eau. Pulvérisation.

Nombre maximum d'applications de ce produit ou d'un produit contenant la même substance active : 3 par 12 mois

Délai avant récolte: 21 jours.

Zone tampon minimale de 20 m avec technique raduisant la dérive de 90%.

Noix communes

Pour lutter contre l'antracnose à la dose de 0,07 kg/hL

Délai avant récolte: 42 jours.

Maximum 1 application.

Amandes

Pour lutter contre la tavelure et la maladie criblée des arbres fruitiers à la dose de 0,05 kg/hL.

Délai avant récolte: 56 jours.

Maximum 2 applications.

Préparation de la bouillie

- Compatibilité : le **Delan® 70 WG** ne peut pas être mélangé avec les huiles minérales. Enlever le filtre avant d'introduire le produit dans la cuve du pulvérisateur. Pulvériser immédiatement après le mélange.
- Le **Delan® 70 WG** ne sera pas appliqué par forte chaleur ni par un ensoleillement fort.

Remarques importantes

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

Stockage

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas polluer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Remarque générale concernant la dose

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance, ...). Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches résistantes à la matière active. Pour

diminuer ce risque, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquence des traitements, conditions d'application, etc.) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Garantie

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Appelbomen (open lucht)

Tijdens ascosporenluchten

Voor de preventieve bestrijding van schurft (*Venturia inaequalis*), volgens de waarschuwingen aan de **dosis** van 0,5 kg/ha fruithaag (of 0,75 kg/ha voor een standaard boomgaard).

Op appelrassen met gevoelige schil (Golden delicious) zal **Delan® 70 WG** aan de preventieve dosis (0,5 kg/ha fruithaag of 0,75 kg/ha voor een standaard boomgaard) vanaf het stadium G (roze knop) tot het stadium N (einde van de vruchtval) vervangen worden door een ander fungicide, wegens risico voor een lichte toename van ruwschilligheid.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

In de zomerperiode

Delan® 70 WG kan gebruikt worden tijdens de zomerperiode na een geslaagde bestrijding van de ascosporen voor de bestrijding van schurft (conidien) aan een **dosis** van 0,23 kg/ha voor een fruithaag (0,35 kg/ha voor een standaard boomgaard) in een 7 – 10 dagenschema.

Wachttijd vóór de oogst: 28 dagen.

Maximum 6 toepassingen/12 maanden.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Perenboom (open lucht)

Voor de bestrijding van schurft (*Venturia pirina*), preventief, volgens de waarschuwingen.

Dosis: 0,5 kg/ha fruithaag (of 0,75 kg/ha voor een standaard boomgaard).

Wachttijd vóór de oogst: 28 dagen.

Maximum 6 toepassingen/12 maanden.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Kersen- en kriekenboom (open lucht)

Ter bestrijding van de bladziekte (*Blumeriella jaapii* / *Cyclinodrosporium padi*), na de bloei preventief en regelmatig (ongeveer om de 10 dagen) toe te passen.

– Laagstammige bomen : 700 g/ha voor een fruithaag (1 kg/ha voor een standaard boomgaard).

– Hoogstammige bomen : 70 g/ 100 L.

Wachttijd vóór de oogst: 28 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Hop (open lucht)

Bestrijding van valse meeldauw (*Pseudoperonospora humuli*). Dosis : 0,05 % (= 50 g/100 L water). Preventief en regelmatig herhalen (om de 7 – 10 dagen).

Wachttijd vóór de oogst: 28 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Rozelaars (open lucht en onder bescherming)(niet bestemd voor consumptie)

Ter bestrijding van sterroetdauw (*Diplocarpon rosae*).

Dosis : 75 g/100 L water. Toe te passen om de 7 – 10 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek (open lucht).

Druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van rode brand, zwartelekkenziekte en valse meeldauw.

Dosis : 0,4 kg/ha haag, 1 toepassing.

Opmerking : max. 1 toepassing/12 maanden.

Wachttijd vóór de oogst : 48 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Erkende gebruiken die niet getest zijn door BASF, waardoor het gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker valt. BASF kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

Perzik- en nectarinebomen en abrikozen (open lucht)

Voor de bestrijding van schurft (*Venturia carpophila*).

Dosis: 0,5 kg kg/ha voor een fruithaag (0,9 kg/ha voor een standaard boomgaard), 1 – 2 toepassingen.

Voor de bestrijding van hagelschotziekte (*Stigmia carpophila* (*Coryneum beijerinckii*)).

Dosis: 0,7 kg kg/ha voor een fruithaag (1,26 kg/ha voor een standaard boomgaard), 1 – 2 toepassingen.

Wachttijd vóór de oogst: 28 dagen.

Opmerking: max. 3 toepassingen/12 maanden.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Voor de bestrijding van perzikkrulziekte (*Taphrina deformans*).

Toepassingsstadium: ontwikkeling van de eerste bladeren – begin van de scheutgroei, de stengel van het scheutje wordt zichtbaar (BBCH 10-31).

Dosis: 0,5 kg kg/ha voor een fruithaag (0,9 kg/ha voor een standaard boomgaard), 1 – 3 toepassingen, interval 10 – 14 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Wortelen (open lucht)

Voor de bestrijding van *Alternaria dauci*.

Dosis: 1,8 kg/ha, 3 toepassingen om de 7 tot 10 dagen vanaf het verschijnen van de ziekte.

Wachttijd vóór de oogst: 14 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Aalbessen (wit, rood en zwarte) en stekelbessen (kruisbessen) en kruisingen (open lucht) en (onder bescherming)

Toepassingsstadium: voor de bloei en/of na de de pluk. Voor de bestrijding van bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*).

Dosis: 0,7 kg kg/ha voor een fruithaag, 2 – 3 toepassingen, interval 7 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek (open lucht).

Veenbessen (open lucht) en (onder bescherming)

Toepassingsstadium: voor de bloei en/of na de de pluk. Voor de bestrijding van bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*).

Dosis: 0,7 kg kg/ha voor een fruithaag, 2 – 3 toepassingen, interval 7 dagen.

Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek (open lucht).

Braam- en frambozenstruiken (open lucht) en (onder bescherming)

Voor de bestrijding van stengelziekten (*Didymella applanata*,...), bramenroest (*Phragmidium violaceum*) en frambozenroest (*Phragmidium rubi-idaei*).

Dosis: 0,7 kg kg/ha voor een fruithaag, 1 – 3 toepassingen.

Opmerking: max. 3 toepassingen/12 maanden.

Wachttijd vóór de oogst: 14 dagen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek (open lucht).

Sierplanten (Niet bestemd voor consumptie) (open lucht en onder bescherming)

Voor de bestrijding van bladplekkenziekte (*Cylindrosporium*), blad- en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora* spp. / *Peronospora* spp.), schurft (*Venturia*, *Spilocaea*), roest (*Puccinia*, *Uromyces*, *Phragmidium*,...), hagelschotziekte (*Stigmia carpophila* (*Coryneum beijerinckii*)).

Dosis : 75 g/100 L, 1-3 toepassingen.

Opmerking : max. 3 toepassingen/12 maanden.

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: *Buxus*, *Azalea*, *Chamaecyparis*, *Pelargonium* en *Waldsteinia*.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek (open lucht).

Voor de erkende gebruiken in het G.H.L. verwijzen wij naar het franstalige gedeelte van dit etiket.

Klaarmaken van de spuitoplossing

Mengbaarheid : **Delan® 70 WG** mag niet gemengd gespoten worden met minerale oliën. Verwijder eerste de filter vooraleer het product in het spuittoestel te gieten. Spuiten onmiddellijk na de menging.

– **Delan® 70 WG** niet spuiten bij hoge temperaturen en volle zon.

Belangrijke opmerkingen

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).

Bewaring

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van AgriRecover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. De verpakking mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend

aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking verontreinigen.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor resistentie, ...).

Bij een groot aantal fungiciden bestaat er een algemeen risico op het optreden van resistente stammen. Om dit risico te verminderen dient de gebruiksaanwijzing (dosering, aantal toepassingen, enz.) te worden opgevolgd. Omdat vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van resistentie kan ook bij handhaving van de gebruiksaanwijzing het risico niet worden uitgesloten. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van resistentie.

Waarborg

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en aangezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Delan® 70 WG

Fongicide de contact en arboriculture fruitière, houblon, rosiers et vignes

Contactfungicide in de fruitteelt, hop, rozelaars en wijnbouw

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette
Raadpleeg steeds de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket

Numéro de lot et date de production : voir emballage
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking
Chargennummer und Produktionsdatum: siehe Verpackung



N° d'autorisation: 8850P/B
Usage professionnel
(G.-D. Lux.: L. 01444-042)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Contient:
70 % de dithianon

Toelatingsnummer: 8850P/B
Beroepsgebruik
(G.H. Lux.: L. 01444-042)
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Bevat:
70 % dithianon

Zulassungsnummer: 8850P/B
Berufliche Anwendung
(G.H. Lux.: L. 01444-042)
Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Enthält:
70 % Dithianon

Mode d'action / Werkingswijze /
Wirkungsmechanismus

Group	M09	Fungicide
	M09	

Distribué par / Versteeld door / Vertrieb durch:
BASF Belgium Coordination Center CommV
B. U. Agriculture Solutions
www.agro.basf.be

SIEGE D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEZETEL
/ OPERATIEVE HAUPTSTITZ
Drève Richelle 161 E bte 43
1410 Waterloo, Belgium
Tel.: +32 (0)2 373.27.23

Renseignements en cas d'urgence /
Alarmnummer / Notrufnummer:
tel.: +32 (0) 9 569 92 32
Centre Antipoisons / Antigifcentrum /
Gifinformatiesentrum:
Belgium tel.: +32 (0) 70 245 245
G.-D. De Luxembourg tel.: +352 (0) 8002 5500

Détenteur d'autorisation / Toelatingshouder /
Zulassungsinhaber:
BASF Belgium Coordination Center CommV
SIEGE SOCIAL / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
/ FIRMENSITZ:
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

**DANGER
GEVAAR
GEFAHR**

5 kg

Mentions de danger:
EUH401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la
santé humaine et l'environnement.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Conseils de Prudence (Prévention):
P280 Porter des gants de protection, des
vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux et du visage.

Conseils de Prudence (Intervention):
P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/
un médecin.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU : laver abondamment à l'eau et
au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX : rincer avec précaution
à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée : consulter un médecin.

P330 Rincer la bouche.

P391 Recueillir le produit répandu.

Gevaaresindicaties:
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

H301 Giftig bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H351 Verdacht van het veroorzaken van
kanker.

H410 Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (Preventie):
P280 Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oogbescherming en
odoraatsbescherming dragen.

Voorzorgsverklaringen (Respons):
P301+P310 NA INSLIKKEN : onmiddellijk een
ANTIGIF CENTRUM/arts raadplegen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID :
met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE
OGEN : voorzichtig afspoleren met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spolen.

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling : een
arts raadplegen.

P330 De mond spoleren.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gefahrenhinweise:
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für
Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen
mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN : Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER
HAUT : Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN : Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen
: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuholen.

P330 Mund ausspülen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Comment mettre
une formulation WG
dans la cuve /
Hoe WG formulering
in spuittank brengen?



Quel produit d'abord
dans la cuve
Welk product eerst in
spuittank brengen WG, SG,
WR, SC, CS, SL, SE, EC, ME.



www.agrirecover.eu

81154657 BE 2071

