METAREX INOV®

SLUG & SNAIL BAIT
COLZACTIVE®



N° d'autorisation: 10204P/B (G.-D. de Lux.: L01952-140) Usage professionnel
Appât (prêt à l'emploi) (RB), contenant 40 g/kg de métaldéhyde

Pour la lutte contre les limaces en cultures arables, cultures maraîchères, fraisiers et cultures ornementales

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette
Raadpleeg steeds de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket

20 kg

Numéro de lot et date de production: voir emballage
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking

Distribué par / Verdeeld door:
BASF Belgium Coordination Center CommV
B.U. Agricultural Solutions
www.agro.basf.be
SIEGE D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEZETEL:
Drève Richelle 161 E boîte 43,
1410 Waterloo, Belgium

Détenteur d'autorisation / Toelatingshouder :
De Sangosse SA, B.P. 5, F- 47480 Pont-du-Casse, France

® = Marque déposée De Sangosse / Gedeponeerd handelsmerk De Sangosse

V 2.0

Toelatingsnummer: 10204P/B (Gh. Lux.: L01952-140) Professioneel gebruik
Lokmiddel (klaar voor gebruik) (RB), bevattende 40 g/kg metaldehyde

Voor de bestrijding van naaktslakken in akkerbouwgewassen, groenteteelt, aardbeien en sierteelt

Renseignements en cas d'urgence / Alarmnummer : +32 (0) 3 569 92 32
Centre Antipoisons / Antigifcentrum : BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500

UFI: 8200-3050-400Q-UCYV

PhytofarRecover
www.phytofarrecover.eu

BASF
We create chemistry

METAREX INOV®
SLUG & SNAIL BAIT COLZACTIVE®
BASF We create chemistry

METAREX INOV®
SLUG & SNAIL BAIT COLZACTIVE®

MODE D'ACTION

Metarex Inov® est un appât aux performances accrues contre les limaces en agriculture et en horticulture. Cette nouvelle formulation **Colzactive®** bénéficie d'une composition originale et exclusive avec des propriétés uniques : elle libère des substances que les limaces sont capables de percevoir et qui les attirent. Cette formulation provoque une action plus rapide et un fonctionnement à plus faible dose. Grâce au **Colzactive®**, le **Metarex Inov®** montre une excellente attractivité et une excellente appétence. En plus, les granulés sont diabolos pour résister aux conditions humides et montrent d'excellentes aptitudes mécaniques et balistiques. Après l'absorption du **Metarex Inov®**, les limaces ne provoquent plus de dégâts.

MODE D'EMPLOI

Voir le tableau ci-dessous pour les usages autorisés et les stades d'application.

Dose d'emploi :
Dans toutes les cultures (voir tableau ci-dessous), sauf en chicorée : 5 kg/ha, max. 3 applications à intervalle minimal de 5 jours.
En chicorée (plein air) : 7,5 - 10,5 kg/ha, 1 application.
Max. 15 kg par ha par 12 mois.

Méthode d'application : à épandre à l'aide d'un épandeur de granulés.

Délai avant la récolte :
• 7 jours en pommes de terre.
• 49 jours en prairies.
• 20 jours dans les cultures suivantes, sous protection : cresson alénois et autres jeunes pousses, mâche, laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, cresson de fontaine, bette (blette), roquette, jeunes pousses (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles), ciboulette, aneth, angélique, cerfeuil, céleri à couper, carvi, coriandre, liveche, cerfeuil musqué, persil, anis vert, estragon, moutarde blanche, moutarde brune, moutarde noire, geléverver, hyssope, mélisse, menthe, basilic, origan / marjolaine, sauge officinale, sarriette des jardins, thym, laurier, oseille, pourpier et fleurs comestibles.

Mesures de réduction du risque : pour les cultures en plein air, respecter une zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Conseils d'utilisation : appliquer par temps humide et récolter l'application quand les granulés ont été consommés et quand de nouvelles générations de limaces sont constatées. L'utilisation de pièges à limaces spécifiques est fortement conseillée pour être en mesure d'évaluer les risques d'attaques.

Cultures (localisation)	Stade d'application
Pépinières (chaîne de production, de sélection et de multiplication) (plein air et sous protection)	repos végétatif - la floraison s'achève (BBCH 00-67)
Pommes de terre (plein air)	≤ BBCH 97 (feuilles et tiges sont mortes, les tiges sont décolorées et sèches)
Betteraves sucrières, betteraves fourragères, chou-navet, rutabaga, navet (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)
Betterave rouge (plein air et sous protection)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)
Chou-fleur (blanc et vert), chou brocoli (plein air)	≤ BBCH 41 (les boutons floraux de la tige se développent, largeur > 1 cm)
Chou de Bruxelles (plein air)	≤ BBCH 41 (début de la formation des pousses latérales)
Chou pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie), chou modèlier et chou fourrager (plein air)	≤ BBCH 41 (début de la formation des têtes, les 2 feuilles les plus jeunes ne se déroulent pas)
Endives, radicchio rosso, pain de sucre (plein air et sous protection)	≤ BBCH 41 (début de la formation des têtes, les 2 feuilles les plus jeunes ne se déroulent pas)
Laitues, épinard, mâche, bette*, cresson alénois et autres jeunes pousses*, cresson de fontaine*, jeunes pousses* (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles), roquette* (plein air et sous protection)	≤ BBCH 41 (10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée)
Fleurs comestibles* (plein air et sous protection)	≤ BBCH 41 (10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée)
Ciboulette*, angélique*, aneth*, cerfeuil*, céleri à couper*, carvi*, coriandre*, liveche*, cerfeuil musqué*, persil*, aria vert*, estragon*, moutarde* (brune, blanche et noire), hyssope*, mélisse*, menthe*, basilic*, origan* / marjolaine*, sauge officinale *, sarriette des jardins*, thym*, laurier*, oseille*, pourpier* (consommation des feuilles) (plein air et sous protection)	≤ BBCH 41 (10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée)
Genévrier* (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air et sous protection)	≤ BBCH 41 (10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée)
Haricot récolté sec (sans cosse), haricot vert (récolté frais avec cosse), fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)
Pois récolté secs (sans cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout), petit pois (sans cosse) (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles (avec stipules) sont étalées ou 5 villes sont formées (espèce sans limite))
Lin de printemps (plein air)	≤ BBCH 17 (7 cm de hauteur)
Colza d'hiver et de printemps et navette (plein air)	≤ BBCH 17 (7 feuilles étalées)
Moutarde blanche (comme engrais vert) (plein air)	≤ BBCH 17 (7 feuilles étalées)
Céréales, y compris la production de semences (plein air) : froment d'hiver et de printemps, orge d'hiver et de printemps, avoine d'hiver et de printemps, seigle d'hiver et de printemps, triticale d'hiver et de printemps et épeautre d'hiver et de printemps	≤ BBCH 29 (fin tallage)
Maïs et maïs doux (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)
Prairies (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)
Gazons, pelouses et terrains de golf (plein air)	/
Plantes ornementales, mauve*, jasmin*, géranium rosat*, petite pervenche* et potentille* (pas pour consommation) (plein air et sous protection)	/
Tabac (plein air et sous protection)	/
Chicorée (plein air)	≤ BBCH 15 (5 feuilles étalées)

* Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarques importantes

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
SPe6 : Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu.

Remarques générales

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
Outre les zones tampon indiquées sur l'étiquette, des zones tampon régionales s'appliquent également. Il convient de toujours respecter la zone tampon la plus large. Une attention particulière sera également accordée à la présence dans certaines conditions d'un couvert végétalisé permanent.
La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Stockage

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.
Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Garantie

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

ATTENTION / WAARSCHUWING / ACHTUNG

Mentions de danger:
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence:
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.
Informations additionnelles sur les dangers:
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Gevarenaanduidingen:
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Veiligheidsaanbevelingen:
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie:
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Gefahrenhinweise:
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zusätzliche Gefahrenинformationen:
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen

UFI: 8200-3050-400Q-UCYV
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500

WERKINGSWIJZE

Metarex Inov® is een lokaas met uitzonderlijke werking tegen naaktslakken in land- en tuinbouw. Deze nieuwe formulatie **Colzactive®** dankt haar unieke eigenschappen aan een originele en uitzonderlijke samenstelling: zij geeft stoffen vrij die zeer gemakkelijk waargenomen worden door slakken en hen ook sterk aantrekt. Deze formulering geeft een snelle werking aan een zeer lage dosering. **Metarex Inov®** geeft een uitstekende aantrekking en is bijzonder smakelijk voor slakken. Bovendien zijn de granulaten zodanig ontwikkeld opdat zij hun kwaliteit behouden in vochtige omstandigheden. De ballistische en mechanische eigenschappen van de granulaten zijn optimaal, hetgeen zeer belangrijk is voor de toepassingen in de praktijk. Na opname van **Metarex Inov®** veroorzaken de slakken geen schade meer.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zie onderstaande tabel voor toegestaan gebruik en toepassingsstadia

Dosis :
In alle teelten (zie onderstaande tabel), behalve in cichorei : 5 kg/ha, max. 3 toepassingen met een interval van ten minste 5 dagen tussen twee toepassingen.
In cichorei (open lucht) : 7,5 - 10,5 kg/ha, 1 toepassing.
Max. 15 kg per ha per 12 maanden.

Toepassingstechniek : toe te passen met behulp van een granulaatstrooier.

Wachttijd vóór de oogst :
• 7 dagen in aardappelen.
• 49 dagen in grasland / weiland.
• 20 dagen in volgende teelten, onder bescherming : tuinkers en andere kiemen en scheuten, veldsla, slasoorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, spinazie, waterkers, warmoes (snijbiet), rucola, babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren), bieslook, dille, engelwortel, kervel, snijselder, karwij, koriander, lavas / maggiplant, roomse kervel, peterselie, anijs, dragon, witte en gele mosterd, rode amsoi, zwarte mosterd, jenneverbes, hysop, citroenmelisse, munt, basilicum, marjolein / oregano, salie, bonenkruid, tijm, laurier, zuring, postelein en eetbare bloemen.

Risicobeperkende maatregelen : voor de teelten in open lucht, een minimale buffer zone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater respecteren.

Gebruiksadvies : toepassen bij vochtig weer en de toepassing herhalen wanneer de korrels opgegeten zijn en nieuwe generaties van slakken zijn waargenomen. Het gebruik van specifieke slakkenvallen wordt sterk aanbevolen om het risico op aanvallen te kunnen inschatten.

Teelten (locatie)	Toepassingsstadium
Aardbeiplanten (productie-, selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht en onder bescherming)	vegetative rustperiode - bloei loopt ten einde (BBCH 00-67)
Aardappelen (open lucht)	≤ BBCH 97 (bladeren en stengels afgestorven, stengels geïsoleerd en droog)
Suikerbieten, voederbieten, raap (stoppelraap, meiraap), koolrapen (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)
Rode biet (knoten) (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)
Bloemkool (witte en groene), broccoli (open lucht)	≤ BBCH 41 (ontwikkeling roosjes, grootte > 1 cm)
Spruitkool (open lucht)	≤ BBCH 41 (begin ontwikkeling zijknoppen)
Sluitkool (kabuskool, witte, rode, savooi- en spitskool), merglkool en voederkool (open lucht)	≤ BBCH 41 (begin vorming van kool, 2 jongste bladeren ontvouwen niet meer)
Andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 41 (begin vorming van krop, 2 jongste bladeren ontvouwen niet meer)
Slasoorten, spinazie, veldsla, warmoes* (snijbiet), tuinkers en andere kiemen en scheuten*, waterkers*, babyleaf* (geoogst tot het stadium 8 bladeren), rucola* (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 41 (10% van varietietspecifieke bladmassa bereikt)
Eetbare bloemen* (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 41 (10% van varietietspecifieke bladmassa bereikt)
Bieslook*, engelwortel*, dille*, kervel*, snijselder*, karwij*, koriander*, lavas* / maggiplant*, roomse kervel*, peterselie*, anijs*, dragon*, witbiergele en zwarte mosterd*, rode amsoi*, hysop*, citroenmelisse*, munt*, basilicum*, marjolein* / oregano*, salie*, bonenkruid*, tijm*, laurier*, zuring*, postelein* (consumptie bladeren) (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 41 (10% van varietietspecifieke bladmassa bereikt)
Jenneverbes* (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht en onder bescherming)	≤ BBCH 41 (10% van varietietspecifieke bladmassa bereikt)
Droogeoogste stamslabonen (zonder peul), stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul), vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-…) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)
Droogeoogste erwten (zonder peul) en groengeoogste erwten (zonder en met peul) (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren (met steunbladeren) ontvouwen of 5 ranken gevormd)
Zomervlas (open lucht)	≤ BBCH 17 (7 cm hoogte)
Winter- en zomerkoolzaad en raapzaad (open lucht)	≤ BBCH 17 (7 bladeren ontvouwen)
Witte en gele mosterd (als groenbemester) (open lucht)	≤ BBCH 17 (7 bladeren ontvouwen)
Graangewassen, zaadproductie inbegrepen (open lucht) : winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerhaver, winter- en zomerrogge, winter- en zomertriticale en winter- en zomerspelt	≤ BBCH 29 (einde van de uitsoeling)
Mais en suikermais (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)
Grasland / weiland (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)
Gazons, grasvelden en golfterreinen (open lucht)	/
Sierplanten, kaasjeskruid*, jasmijn*, geranium*, maagdenpalm*, ganzerik* (niet bestemd voor consumptie) (open lucht en onder bescherming)	/
Tabak (open lucht en onder bescherming)	/
Chicorei (open lucht)	≤ BBCH 15 (5 bladeren ontvouwen)

* Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Belangrijke opmerkingen

SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
SPe6 : Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Algemene opmerkingen

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Er zal ook aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van permanente begroende bedekking onder bepaalde voorwaarden.
De toegestaan dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Bewaring

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

Lege verpakkingen en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Raadpleeg desnoods uw handelaar. De verpakking mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking.

Waarborg

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en aangezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van the hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Ref. :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
EN CAS D'INGESTION:
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

20 kg

DE SANGOSSE

ATTENTION
WAARSCHUWING
ACHTUNG

UFI: 8200-3050-400Q-UCYV

BASF
We create chemistry

DO NOT PRINT