

# Pontos®

**V2.0**

**Herbicide pour la lutte contre les graminées  
et les dicotylées annuelles en céréales  
d'hiver**

**Herbicide ter bestrijding van éénjarige  
grassen en breedbladige onkruiden in  
wintergranen**

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette  
Raadpleeg steeds de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket

Numéro de lot et date de production: voir emballage

Lotnummer en productiedatum: zie verpakking

Chargennummer und Produktionsdatum: siehe Verpackung

# 5 L



4 041885 019851



® = Marque déposée BASF / Gedeponoord handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF

81179094 BE 2104



## Mode d'action

Le **Pontos**® est un herbicide pour la lutte contre les graminées annuelles (comme le vulpin, le jouet du vent, le pâturin) et les dicotylées annuelles (comme le gaillet, le mouron des oiseaux, les véroniques, les repousses de colza, les matricaires, le coquelicot, la capselle bourse à pasteur, la moutarde des champs, la pensée des champs, le séneçon commun) en céréales d'hiver (froment d'hiver, orge d'hiver, épeautre d'hiver, seigle d'hiver et triticale d'hiver).

La meilleure efficacité du **Pontos**® est obtenue sur des adventices peu développées (en pré-émergence ou post-émergence précoce).

## Mode d'emploi

| Cultures*<br>(plein air)                                                                         | Pour lutter contre                                   | Stade<br>d'application                                                                                           | Méthode<br>d'application et<br>dose d'emploi | Conditions<br>d'application                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Froment d'hiver,**<br>Epeautre d'hiver,<br>Orge d'hiver,<br>Seigle d'hiver,<br>Triticale d'hiver | graminées<br>annuelles et<br>dicotylées<br>annuelles | semence sèche<br>– levée: le<br>coléoptile perce la<br>surface du sol<br>(BBCH 00-09)                            | pulvérisation,<br>1 l/ha,<br>1 application   | Max. 1 application<br>par culture.<br>Mesure de<br>réduction du<br>risque: zone<br>tampon de 20 m<br>par rapport aux<br>eaux de surface<br>avec technique<br>classique. |
|                                                                                                  |                                                      | première feuille<br>sort du coléoptile<br>– fin tallage:<br>nombre maximal<br>de talles visibles<br>(BBCH 10-29) | pulvérisation,<br>0,5 l/ha,<br>1 application |                                                                                                                                                                         |

\* En culture classique et pour la production de semences.

\*\* En froment d'hiver : l'utilisation de ce produit doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe.

## Conseils d'utilisation

De façon générale, le semis sera régulier et suffisamment profond (3 cm). Les meilleurs résultats sont obtenus sur un sol relativement fin et un lit de semences humide. Un manque de sélectivité peut être noté lors de précipitations abondantes dans les jours suivant le traitement.

En froment d'hiver, l'utilisation du **Pontos**® doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe.

## Préparation de la bouillie

Utiliser un matériel propre et sans résidus de produits de la pulvérisation précédente. Avant l'utilisation, tester l'appareil et vérifier le débit de chaque jet selon les instructions du constructeur.

Remplir la cuve avec les  $\frac{3}{4}$  du volume d'eau requis. Mettre l'agitation en marche, bien agiter le bidon et ajouter la quantité requise du produit. Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer les emballages vides à l'eau claire et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Puis compléter avec de l'eau jusqu'au volume final. Appliquer la bouillie immédiatement après sa préparation. Laisser l'agitateur en fonctionnement en permanence jusqu'à la fin de la pulvérisation. Eviter les pauses durant la pulvérisation. Après une pause obligatoire (panne), brasser convenablement la bouillie avant de recommencer le travail.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

## Cultures adjacentes

Si le **Pontos**® est appliqué selon les bonnes pratiques agricoles, une zone non traitée de 1 mètre entre la culture traitée avec le produit et la culture adjacente est suffisante pour éviter des dégâts.

## Cultures suivantes

Il n'y a pas de restriction quant à l'implantation d'une culture après la récolte normale des céréales traitées uniquement avec ce produit.

## Cultures de remplacement

En cas d'échec de la culture :

- du froment d'hiver peut être implanté, le même automne, après un travail du sol sur au moins 15 cm de profondeur ;
- les cultures listées ci-après peuvent être implantées après un délai de 60 jours après l'application de ce produit et après un travail du sol sur au moins 15 cm de profondeur : légumes, maïs, betteraves sucrières et tournesol ;
- du colza peut être semé après un délai de 90 jours après une application de ce produit en pré-émergence ou après un délai de 60 jours après une application de ce produit en post-émergence et après un travail du sol sur au moins 15 cm de profondeur ;
- de l'orge de printemps peut être semé après un délai de 120 jours après une application de ce produit et après un travail du sol sur au moins 15 cm de profondeur.

## Remarques importantes

**SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

**SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 15 et 12.

**SPe2:** Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

**SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

**SPO:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus. Voir les conseils spécifiques sur l'étiquette.

### Remarques générales

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Outre les zones tampon indiquées sur l'étiquette, des zones tampon régionales s'appliquent également. Il convient de toujours respecter la zone tampon la plus large. Une attention particulière sera également accordée à la présence dans certaines conditions d'un couvert végétalisé permanent.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple lors de l'utilisation de produits en mélange. Cependant, l'application d'une dose réduite peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance, ...). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Une résistance (et donc une efficacité diminuée du produit) peut se développer lorsque des produits ayant le même mode d'action sont utilisés de façon répétée. Puisqu'il est impossible de prévoir ce développement de résistance, l'utilisation des produits doit être conforme aux stratégies de gestion de la résistance établies pour la culture et le type d'utilisation. Les stratégies de gestion de la résistance peuvent inclure l'alternance et/ou le mélange en cuve de produits ayant des modes d'action différents ou la limitation du nombre total d'applications par saison. Dans la mesure du possible, semer ou planter des variétés résistantes ou tolérantes et mettre en place des pratiques culturales appropriées. Une gestion responsable de la résistance est encouragée pour assurer une efficacité du produit à long terme.

## **Stockage**

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

## **Emballages vides et surplus de traitement**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

## **Garantie**

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

## Werkingswijze

**Pontos**® is een herbicide voor de bestrijding van éénjarige grassen (zoals duist, windhalm en straatgras) en éénjarige breedbladige onkruiden (zoals kleeftkruid, vogelmuur, ereprijssoorten, opslag van koolzaad, kamille, klapproos, herderstasje, herik, akkerviooltje, klein kruiskruid) in wintergranen (wintertarwe, wintergerst, winterspelt, winterrogge en wintertriticale).

De beste werking van **Pontos**® wordt verkregen op weinig ontwikkelde onkruiden (in voor-opkomst of vroege na-opkomst).

## Gebruiksaanwijzing

| Teelten*<br>(open lucht)                                                          | Ter bestrijding<br>van                                                                 | Toepassings-<br>stadium                                                                                                                       | Toepassings-<br>techniek en dosis        | Toepassings-<br>voorwaarden                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wintertarwe**,<br>winterspelt,<br>wintergerst,<br>winterrogge,<br>wintertriticale | éénjarige<br>grassachtige<br>onkruiden en<br>éénjarige<br>tweezaadlobbige<br>onkruiden | droog zaad –<br>opkomst:<br>coleoptiel komt<br>tevoorschijn<br>(BBCH 00-09)                                                                   | bespuiting,<br>1 l/ha,<br>1 toepassing   | Max. 1 toepassing<br>per teelt.<br><br>Risicobeperkende<br>maatregelen:<br>bufferzone van<br>20 m ten opzichte<br>van<br>oppervlaktewater<br>met klassieke<br>techniek. |
|                                                                                   |                                                                                        | eerste blad komt<br>uit coleoptiel<br>tevoorschijn<br>– einde van de<br>uitstoeling:<br>maximaal aantal<br>spruiten zichtbaar<br>(BBCH 10-29) | bespuiting,<br>0,5 l/ha,<br>1 toepassing |                                                                                                                                                                         |

\* In de klassieke teelt en de teelt voor zaadproductie.

\*\* In wintertarwe : het gebruik van dit product moet vermeden worden in geval van onregelmatige zaai met onvoldoende bedekking, in lichte of hydromorfe gronden.

## Gebruiksadvies

Regelmatig en voldoende diep zaaien (3 cm). De beste resultaten worden verkregen op een tamelijk fijn en vochtig zaaibed. Men kan symptomen van fytoxiciteit waarnemen in geval van zware neerslag kort na de behandeling.

In wintertarwe moet het gebruik van **Pontos**® vermeden worden in geval van onregelmatige zaai met onvoldoende bedekking (kluiterige grond) en in lichte of hydromorfe gronden.

## Klaarmaken van de spuitoplossing

Het spuittoestel moet zuiver zijn en mag geen resten bevatten van voorgaande spuitmiddelen.

Voor het gebruik, het spuittoestel testen en het debiet van alle spuitdoppen controleren. De instructies van de fabrikant naleven.

De spuittank vullen met  $\frac{3}{4}$  van het benodigde watervolume. Het roersysteem in werking zetten, de bus goed schudden en de benodigde hoeveelheid van het product toevoegen. In het kader van de goede landbouwpraktijken, dient men de lege verpakkingen met helder water te spoelen en het bekomen spoelwater in de spuittank te gieten. Nadien de tank verder vullen met water tot de gewenste hoeveelheid. Gebruik de spuitoplossing onmiddellijk na bereiding. Laat het roersysteem permanent in werking tot het einde van de bespuiting. Vermijd onderbrekingen bij het bespuiten. Na een verplichte onderbreking (panne) moet men, vooraleer het werk verder te zetten, de spuitoplossing in de tank opnieuw grondig omroeren.

Na gebruik het spuittoestel grondig reinigen.

## Naburige gewassen

Als **Pontos**® toegepast wordt volgens de goede landbouwpraktijken, is een bufferzone van één meter tussen het gewas behandeld met **Pontos**® en het naburig gewas voldoende om schade te voorkomen.

## Volggewassen

Er is geen beperking ten aanzien van volggewassen in een normale teeltrotatie na de teelt van graan dat uitsluitend met dit product werd behandeld.

## Vervanggewassen

In geval van uitval van de teelt :

- wintertarwe kan direct in de herfst gezaaid worden na een grondbewerking van minstens 15 cm diepte;
- de volgende teelten kunnen gezaaid worden na een wachttijd van 60 dagen na de toepassing van dit product en na een grondbewerking van minstens 15 cm diepte : groenten, maïs, suikerbieten en zonnebloem;
- koolzaad kan gezaaid worden na een wachttijd van 90 dagen na de toepassing van dit product in de voor-opkomst of na een wachttijd van 60 dagen na de toepassing van dit product in na- opkomst en na een grondbewerking van minstens 15 cm diepte;
- zomergerst kan gezaaid worden na een wachttijd van 120 dagen na de toepassing van dit product en na een grondbewerking van minstens 15 cm diepte.

## Belangrijke opmerkingen

**SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 15 en 12.

**SPe2:** Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als «sterk erosiegevoelig». Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

**SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

**SPO:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. Zie specifiek advies op het etiket.

### Algemene opmerkingen

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Er zal ook aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van permanente begroeide bedekking onder bepaalde voorwaarden.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld bij toepassing van mengsels van verschillende producten. De toepassing van een verlaagde dosis kan echter leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, afname van de persistentie, verhoogd risico op resistentie, ...). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Resistentie (en dus verminderde werkzaamheid van het product) kan ontstaan wanneer producten met hetzelfde werkingsmechanisme herhaaldelijk worden gebruikt. Aangezien het onmogelijk is om deze ontwikkeling van resistentie te voorspellen, moet het gebruik van producten in overeenstemming zijn met de resistentiebeheerstrategieën die zijn bepaald voor de teelt en het type gebruik. Resistentiebeheerstrategieën kunnen bestaan uit het afwisselen en/of mengen van producten met verschillende werkingsmechanismen of het beperken van het totale aantal toepassingen per seizoen. Zaai of plant resistente of tolerante rassen waar mogelijk en pas geschikte teeltpraktijken toe. Verantwoord resistentiebeheer wordt aangemoedigd om de werkzaamheid van het product op lange termijn te waarborgen.



## **Bewaring**

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

## **Lege verpakkingen en behandelingsoverschotten**

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Raadpleeg desnoods uw handelaar. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking.

## **Waarborg**

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en aangezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

## Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen

UFI: JUM3-70QQ-V00G-1E2R

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EN CAS D'INGESTION:</b><br>Rincer la bouche.<br>Appeler le CENTRE ANTIPPOISONS ou un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NA INSLIKKEN:</b><br>De mond spoelen.<br>Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EN CAS D'INHALATION:</b><br>Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.<br>Appeler le CENTRE ANTIPPOISONS ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                    | <b>NA INADEMING:</b><br>De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.<br>Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                                                                         |
| <b>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:</b><br>Enlever les vêtements contaminés.<br>Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.<br>En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.<br>Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.<br>Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. | <b>BIJ CONTACT MET DE HUID:</b><br>Verontreinigde kleding uittrekken.<br>Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.<br>Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.<br>Verontreinigde werkkleding mag de werkrumte niet verlaten.<br>Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| <b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</b><br>Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                          | <b>BIJ CONTACT MET DE OGEN:</b><br>Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                    |
| <b>Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoissons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Pontos®

**V2.0**

**Herbicide pour la lutte contre les graminées  
et les dicotylées annuelles en céréales  
d'hiver**

**Herbicide ter bestrijding van éénjarige  
grassen en breedbladige onkruiden in  
wintergranen**

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette  
Raadpleeg steeds de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket

Numéro de lot et date de production: voir emballage

Lotnummer en productiedatum: zie verpakking

Chargennummer und Produktionsdatum: siehe Verpackung

# 5 L



4 041885 019851



# Pontos®

V2.0

ATTENTION  
WAARSCHUWING  
ACHTUNG



N° d'autorisation: 10604P/B  
(G.-D. de Lux.: L02262-042)  
Usage professionnel  
Suspension concentrée (SC)  
Contient:  
100 g/l (8,74 % p/p) de picolinafène et  
240 g/l (20,98 % p/p) de flufenacet

Toelatingsnummer: 10604P/B  
(Gh. Lux.: L02262-042)  
Professioneel gebruik  
Suspensieconcentraat (SC)  
Bevat:  
100 g/l (8,74 gew. %) picolinafen en 240 g/l  
(20,98 gew. %) flufenacet

Zulassungsnummer: 10604P/B  
(Gh. Lux.: L02262-042)  
Professioneller Einsatz  
Suspensionskonzentrat (SC)  
Enthält:  
100 g/l (Gew.-%: 8,74) Picolinafen und  
240 g/l (Gew.-%: 20,98) Flufenacet

Mode d'action / Werkingswijze /  
Wirkungsmechanismus

GROUP 12 (F1) 15 (K3) HERBICIDES

UFI: JUM3-70QQ-V00G-1E2R

# 5 L

## Mentions de danger:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  
des effets néfastes à long terme.

## Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de  
pulvérisation.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de  
protection et un équipement de protection du visage.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver  
abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter  
un médecin.  
P391 Recueillir le produit répandu.

## Informations additionnelles sur les dangers:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les  
risques pour la santé humaine et l'environnement.

**Composants dangereux:** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS:  
2634-33-5) et 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2682-20-4)

## Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H373 Kan schade aan.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

## Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding  
en gelaatsbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET  
DE HUID: Met veel water wassen  
gedurende minstens 15 minuten.  
P314 Bij onwel voelen een arts  
raadplegen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag:  
Een arts raadplegen.  
P391 Gelekte/gemorste stof  
opruimen.

**Aanvullende gevareninformatie:**  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing  
om gevaar voor de menselijke  
gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

## Gevaarlijke bestanddelen:

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS  
: 2634-33-5) en 2-methylisothiazool-  
3(2H)-on (CAS: 2682-20-4)

## Gefahrenhinweise:

H317 Kann allergische  
Hautreaktionen verursachen.  
H373 Kann.  
H410 Sehr giftig für  
Wasserorganismen mit langfristiger  
Wirkung.

## Sicherheitshinweise:

P261 Einatmen von Dampf und  
Aerosol vermeiden.

Distribué par / Verdeeld door / Vertriebt durch:  
BASF Belgium Coordination Center CommV  
B. U. Agricultural Solutions  
www.agro.basf.be

SIEGE D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEZETEL / OPERATIVER  
HAUPTSITZ:  
Drève Richelle 161 E boîte 43,  
1410 Waterloo, Belgium

Renseignements en cas d'urgence / Alarmnummer / Notrufnummer:  
BE +32 (0) 3 569 92 32  
Centre Antipoisons / Antigifcentrum / Giftinformationszentrum:  
BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500

Détenteur d'autorisation / Toelatingshouder / Zulassungsinhaber:  
BASF Belgium Coordination Center CommV  
SIEGE SOCIAL / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / FIRMENSITZ:  
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

® = Marque déposée BASF / Gedeponoord handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF



www.agrirecover.eu