

Priaxor[®] EC

Fongicide systémique contre les
maladies foliaires et du pied en céréales

Systemisch fungicide voor de
bestrijding van de bladziekten en
voetziekte in granen

N° de lot : voir emballage
Lotnummer : zie verpakking

5 L

 **BASF**
We create chemistry

© = Marque déposée BASF / Gedeponoord handelsmerk BASF

81135628 BE 1079



Mode d'action

Priaxor® EC est un fongicide polyvalent (blé, orge, épeautre, seigle, triticale et avoine), à action préventive et curative, efficace contre le piétin-verse et les maladies foliaires des céréales et pour la production de semences également.

Il associe deux substances actives aux propriétés complémentaires, le fluxapyroxad, de la famille des carboxamides et le pyraclostrobine de la famille des strobilurines :

- les deux substances actives possèdent des champs d'activité larges et complémentaires sur les principaux pathogènes des céréales.
- l'association de deux modes d'action différents renforce l'efficacité et réduit le risque d'apparition de résistance.
- leur mode d'action systémique confère à la plante une protection complète du feuillage.

Priaxor® EC offre un haut niveau de protection contre les principales maladies du feuillage. Il se caractérise par une grande rapidité d'action et une bonne persistance.

Priaxor® EC est sélectif à tous les stades des céréales.

Conseils d'utilisation

En froment et épeautre : très efficace contre la rouille brune (*Puccinia recondita*), la rouille jaune (*P. striiformis*) et la septoriose (*Septoria tritici* et *S. nodorum*) et aussi pour lutter contre le piétin-verse (*Pseudocercospora herpotrichoides*), l'oïdium (*Erysiphe graminis*) et l'helminthosporiose du blé (*Pyrenophora tritici-repentis*).

En triticale : très efficace contre la rouille brune (*Puccinia recondita*), la rouille jaune (*P. striiformis*), la septoriose (*Septoria* spp.) et aussi pour lutter contre l'oïdium (*Erysiphe graminis*) et le piétin-verse (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

En seigle : très efficace contre la rouille brune (*Puccinia recondita*), la rouille jaune (*P. striiformis*) et la rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*) et aussi pour lutter contre l'oïdium (*Erysiphe graminis*) et le piétin-verse (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

En orge : très efficace contre la rouille naine (*Puccinia hordei*), la rouille jaune (*P. striiformis*), l'helminthosporiose (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*), la rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*), la ramulariose (*Ramularia collo-cygni*) et aussi pour lutter contre l'oïdium (*Erysiphe graminis*).

En avoine : très efficace contre la rouille couronnée (*Puccinia coronata*) et aussi pour lutter contre l'oïdium (*Erysiphe graminis*) et le piétin-verse (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

Mode d'emploi

Cultures de céréales* en Plein air	Pour lutter contre	Doses d'emploi	Stades d'application	Conditions d'application
Froment d'hiver, froment de printemps, seigle d'hiver, seigle de printemps, avoine d'hiver, avoine de printemps, épeautre, triticale d'hiver et triticale de printemps	Piétin-verse (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1,5 l/ha, 1 application	Début montaison – deuxième nœud (BBCH 30-32) Préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes	Max. 2 applications/culture Zone tampon de 20m avec technique réduisant la dérive de 75%
Froment d'hiver, froment de printemps, épeautre, triticale d'hiver, triticale de printemps	Septoriose de l'épi (<i>Septoria nodorum</i>), septoriose des feuilles (<i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i>),	1,5 l/ha, 1-2 applications avec une intervalle d'au moins 21 jours	Mi tallage – fin floraison (BBCH 25-69) Préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes	Max. 2 applications/culture Zone tampon de 20m avec technique réduisant la dérive de 75%
Froment d'hiver, froment de printemps, épeautre, triticale d'hiver, triticale de printemps, seigle d'hiver et seigle de printemps	oïdium (<i>Erysiphe graminis</i>), rouille brune (<i>Puccinia recondita</i>), rouille jaune (<i>Puccinia striiformis</i>), helminthosporiose (<i>Pyrenophora</i> , <i>Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i>)			
Orge d'hiver et orge de printemps	Rouille naine (<i>Puccinia hordei</i>), oïdium (<i>Erysiphe graminis</i>), rouille jaune (<i>Puccinia striiformis</i>), helminthosporiose (<i>Pyrenophora</i> , <i>Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i>), rhynchosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulariose de l'orge (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	1,5 l/ha, 1-2 applications avec une intervalle d'au moins 21 jours	Mi tallage – fin épiaison (BBCH 25-59) Préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes	Max. 2 applications/culture Zone tampon de 20m avec technique réduisant la dérive de 75%
Avoine d'hiver et avoine de printemps	Oïdium (<i>Erysiphe graminis</i>), rouille couronnée des graminées (<i>Puccinia coronata</i>)			

*en culture classique et pour la production de semences

Préparation de la bouillie

Utiliser un matériel propre et sans résidus de produits de la pulvérisation précédente. Avant l'utilisation, tester l'appareil et vérifier le débit de chaque jet selon les instructions du constructeur. Remplir la cuve aux $\frac{3}{4}$ du volume d'eau nécessaire. Mettre l'agitation en marche et bien agiter le bidon de **Priaxor[®] EC** avant de verser la quantité nécessaire. Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les emballages vides à l'eau claire et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Puis compléter avec de l'eau jusqu'au volume final. Laisser l'agitateur en fonctionnement pendant le trajet et jusqu'à la fin de la pulvérisation. Après application, nettoyer soigneusement l'appareil.

Remarques importantes

Produit destiné à un usage professionnel.

SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo : ne pas pénétrer dans les cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe2 : pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme « sterk erosiegevoelig ». Pour la région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une **zone tampon non traitée de 20 m avec technique réduisant la dérive à 75%** par rapport aux eaux de surface.

Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Contient du 2-éthylhexyle-S-lactate. Peut produire une réaction allergique.

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe, de la chaleur et du gel, dans un endroit ventilé.

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance ...).

Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches résistantes à la matière active. Pour diminuer ce risque, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquence des traitements, conditions d'application, etc.) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Garantie

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

Werkingswijze

Priaxor® EC is een polyvalent fungicide (tarwe, gerst, spelt, rogge, triticale en haver), met preventieve en curatieve werking, voor de bestrijding van oogvlekkenziekte en de bladziekten in de granen alsook voor zaadproductie.

Het product associeert twee actieve stoffen met complementaire eigenschappen; fluxapyroxad, familie van de carboxamiden en pyraclostrobin, familie van de strobilurines:

- de twee actieve stoffen hebben brede en complementaire werkingspectra tegen de belangrijkste pathogenen in de granen.
- de associatie van twee verschillende werkingsmechanismen versterkt de werking en vermindert het risico op het optreden van resistentie.
- de systemische werking zorgt voor een volledige bescherming van het blad.

Priaxor® EC biedt een hoog beschermingsniveau tegen de voornaamste bladziekten. Het product kenmerkt zich door een snelle werking en een goede persistentie.

Priaxor® EC is selectief in elk stadium van het graan.

Gebruiksadvies

In tarwe en spelt : zeer efficiënt tegen bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*P. striiformis*), *Septoria tritici* en *S. nodorum* en ook voor de bestrijding van oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*), witziekte (*Erysiphe graminis*) en *Pyrenophora tritici-repentis*.

In triticale : zeer efficiënt tegen bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*P. striiformis*), *Septoria* spp. en ook voor de bestrijding van witziekte (*Erysiphe graminis*) en oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

In rogge : zeer efficiënt tegen bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*P. striiformis*) en bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*) en ook voor de bestrijding van witziekte (*Erysiphe graminis*) en oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

In gerst : zeer efficiënt tegen dwergroest (*Puccinia hordei*), la rouille jaune (*P. striiformis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), *Ramularia collo-cygni* en witziekte (*Erysiphe graminis*).

In haver : zeer efficiënt tegen kroonroest (*Puccinia coronata*) en ook voor de bestrijding van witziekte (*Erysiphe graminis*) en oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

Gebruiksaanwijzing

Graanteelten* in open lucht	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassings- stadium	Toepassings- voorwaarden
Winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, winter- en zomerhaver, spelt, winter- en zomertriticale	Oogvlekkenziekte (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1,5 l/ha, 1 toepassing	Begin oprichten – 2 ^{de} knoop (BBCH 30-32) Preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen	Max. 2 toepassingen/teelt Bufferzone van 20m met 75% driftreducerende techniek
Winter- en zomertarwe, spelt, winter- en zomertriticale	Bladvlekkenziekte: kafjesbruin (<i>Septoria nodorum</i>), septoriose (<i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i>),	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen	Midden uitstoeling– einde bloei (BBCH 25-69)	Max. 2 toepassingen/teelt Bufferzone van 20m met 75% driftreducerende techniek
Winter- en zomertarwe, spelt, winter- en zomertriticale, Winter- en zomerrogge	Echte meeldauw (<i>Erysiphe graminis</i>), bruine roest (<i>Puccinia recondita</i>), gele roest (<i>Puccinia striiformis</i>), netvlekkenziekte/ strepenziekte (<i>Pyrenophora</i> , <i>Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i>)		Preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen	
Winter- en zomergerst	Dwergroest (<i>Puccinia hordei</i>), echte meeldauw (<i>Erysiphe graminis</i>), gele roest (<i>Puccinia striiformis</i>), netvlekkenziekte/ strepenziekte (<i>Pyrenophora</i> , <i>Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i>), bladvlekkenziekte (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen	Midden uitstoeling– einde aarvorming (BBCH 25-59) Preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen	Max. 2 toepassingen/teelt Bufferzone van 20m met 75% driftreducerende techniek
Winter- en zomerhaver	Echte meeldauw (<i>Erysiphe graminis</i>), kroonroest (<i>Puccinia coronata</i>)			

*In de klassieke teelt en de teelt voor zaadproductie

Klaarmaken van de spuitoplossing

Het spuittoestel moet zuiver zijn en mag geen resten bevatten van voorgaande spuitmiddelen. Voor het gebruik, het spuittoestel testen en het debiet van alle spuitoppen controleren. De instructies van de fabrikant naleven. De tank van de spuitoplossing voor $\frac{3}{4}$ vullen met water en het roersysteem in werking zetten. De bus met **Priaxor[®] EC** goed schudden alvorens de nodige hoeveelheid toe te voegen. In het kader van de goede landbouwpraktijken, dient men de lege verpakkingen drie keer met helder water te spoelen en het bekomen spoelwater in de spuittank te gieten. Nadien de tank verder vullen met water tot de gewenste hoeveelheid. Laat het roersysteem in werking tijdens het traject en tot het einde van de bespuiting. Na de behandeling het toestel grondig schoonmaken.

Belangrijke opmerkingen

Product bestemd voor beroepsgebruik.

SP1 : zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Sp0 : na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Spe2 : om in het water levende organismen te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op de percelen onderhevig aan erosie. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als « sterk erosiegevoelig ». Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

Spe3 : om in het water levende organismen te beschermen mag u in een **bufferzone van 20 m met 75% drift reducerende techniek** ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen.

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

Bevat 2-ethylhexyl-S-lactaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vocht, direct zonlicht, hitte en vorst, op een geventileerde plaats.

Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geleidelige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van AgriRecover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking besmetten.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten. De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor resistentie, ...).

Bij een groot aantal fungiciden bestaat er een algemeen risico op het optreden van resistente stammen. Om dit risico te verminderen dienen de aanwijzingen voor het gebruik in de gebruiksaanwijzing (dosering, aantal toepassingen, enz.) te worden opgevolgd. Omdat vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van resistentie kan ook bij handhaving van de gebruiksaanwijzing het risico niet worden uitgesloten. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van resistentie.

Waarborg

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Nom commercial / Handelsbenaming : Priaxor® EC
Fongicide / Fungicide
Concentré émulsionnable / Emulgeerbaar concentraat (EC)

Détenteur d'agrément / Erkenningshouder : BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
No. d'agrément / Erkenningsnummer : 10616P/B Usage professionnel / Beroepsgebruik

Substance active / Werkzame stof : fluxapyroxad 75 g/L – pyraclostrobin 150 g/L
Autres substances dangereuses (% en poids) / Ander gevaarlijke stoffen (gewichts %) : 2-Ethylhexyl-S-lactate <= 25%;
N,N-Dimethyldodecanamide < 20%; acetophenone < 15%; Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine – unspecified < 5%; Isotridecan-1-ol < 1%

Mentions de danger / Gevaarsaanduidingen : GHS07 - GHS08 - GHS09 - H302 - H332 - H351 - H410 - EUH208 - EUH401

Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P301 P330 P311	EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	NA INSLIKKEN : De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304 P340 P311	EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	NA INADEMING : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 P362 P352 P332+P313 P272 P363	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	BIJ CONTACT MET DE HUID : Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie : een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305 P351 + P338 P337 + P313	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.	BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk ; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Remarques pour le médecin / Opmerkingen voor de arts : /

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum : tel. +32 (0)70 245 245 – G.-D. Lux. tel. (+352) 8002 5500

Priaxor® EC



Attention
Waarschuwing
Achtung



Priaxor® EC

Número d'agrèation : 10616P/B
Usage professionnel
Concentré émulsionnable (EC)
Contient 75 g/L (= 7,3 % w/w)
de fluxapyroxad et
150 g/L (= 14,6 % w/w) de
pyraclostrobine

Erkenningsnummer : 10616P/B
Beroepsgebruik
Emulgeerbaar concentraat
(EC)

Bevat 75 g/L (= 7,3 % w/w)
fluxapyroxad en 150 g/L
(= 14,6 % w/w) pyraclostrobin

Zulassungsnummer : 10616P/B
Berufliche Anwendung
Emulsionskonzentrat (EC)
Enthält 75 g/L (= 7,3 % w/w)
Fluxapyroxad und 150 g/L
(= 14,6 % w/w) Pyraclostrobin

5 L

Mentions de Danger :

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H332 Nocif par inhalation.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 Peut produire une réaction allergique. Contient 2-éthylhexyle-S-lactate.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Conseils de Prudence

(Prévention) :

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Conseils de Prudence

(Intervention) :

- P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P330 Rincer la bouche.
- P391 Recueillir le produit répandu.

Gevaarindicaties :

- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208

Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-ethylhexyl-S-lactaat.

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

81135629 BE 1079

© = Marque déposée BASF
® = Gedeponeerd handelsmerk BASF

Voorzorgsverklaringen (Preventie) :

- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

Veiligheidsaanbevelingen

(Respons) :

- P301 + P310 NA INSLIKKEN : onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P330 De mond spoelen.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gefahrenhinweise :

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält (2S)-2-Hydroxy-Propansaureure-2-Ethylhexylester.
- EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung) :

- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nevel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion) :

- P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN : Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P330 Mund ausspülen.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Distribué par/Verdeeld door/Vertreter durch :

BASF Belgium Coordination Center
Comm.V.
B.U. Agricultural Solutions
SIEGE D'EXPLOITATION/
EXPLOITATIEZETEL/OPERATIVE
HAUPTSITZ

Bâtiment E-F, Drève Richelle 161
Bte 43,
1410 Waterloo
Tel. + 32 (0)2 373 27 23
Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer :
tel. + 32 (0)3 569 92 32
Centre Antipoisons/Antigifcentrum/
Giftinformationszentrum :
Belgium tel. +32 (0)70 245 245
G.-D. De Luxembourg
tel. (+352) 8002 5500

Détenteur d'agrèation/
Erkenningshouder/
Zulassungsinhaber :
BASF Belgium Coordination Center
Comm.V.
SIEGE SOCIAL/
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/
FIRMENSITZ
Scheidelaan 600, 2040 Antwerpen



www.agrirecover.eu