

Terminett®

Fongicide pour la culture de pommes
de terre

Fungicide voor de aardappelteelt

N° de lot : voir emballage

Lotnummer : zie verpakking

5 kg

 **BASF**

We create chemistry

© = Marque déposée BASF

® = Gedeponeerd handelsmerk BASF

81132638 BE 1029

Mode d'emploi

Le produit sera appliqué préventivement ou dès l'apparition des maladies.

Usage : contre l'alternariose (*Alternaria solani*) en pommes de terre (plein air) (consommation et culture de plants).

Dose d'emploi : 0,2 kg/ha.

Application :

Maximum 4 applications par 12 mois avec un intervalle de 10 à 21 jours en fonction de la pression de la maladie. Appliquer alternativement des produits à autres modes d'action contre l'alternariose de préférence à base de mancozèbe, par exemple l'**Acrobat® Extra WG** (n° agr. 8730P/B – G.-D. Lux. : L01445-042). Appliquer dès l'apparition des premiers symptômes. Doit toujours être mélangé avec un produit spécifique contre le mildiou (*Phytophtora sp.*), sous agitation constante et à condition que le produit à mélanger soit agréé au même stade de la culture. Diluer dans une quantité d'eau de 300 - 400 L/ha.

Délai avant récolte : 3 jours.

Zone tampon : minimum 1 m avec technique classique.

Préparation de la bouillie

Enlever le filtre avant d'introduire le produit dans la cuve du pulvérisateur.

Conseils particuliers relatifs à l'utilisation

Pour éviter le développement d'une résistance, il est conseillé d'alterner le **Terminett®** avec des fongicides à autre mécanisme d'action.

On utilisera au maximum 1 kg de substance active boscalid par ha et par an.

Remarques importantes

Produit destiné à un usage professionnel.

SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo : ne pas pénétrer dans des cultures traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir zone tampon).

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire

des effets contraires à ceux recherchés (un manque d'efficacité, une diminution de la rémanence, une augmentation du risque de résistance, ...).

Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches résistantes à la matière active. Pour diminuer ce risque, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquence des traitements, conditions d'application, etc.) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Garantie

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

Gebruiksaanwijzing

Het product wordt preventief toegepast of vanaf het verschijnen van de ziekten.

Gebruik : tegen alternariarot (*Alternaria solani*) in aardappelen (open lucht) (consumptie en pootgoed).

Gebruiksdosis : 0,2 kg/ha.

Behandeling :

Maximum 4 behandelingen per 12 maanden met een interval van 10 tot 21 dagen, afhankelijk van de ziektedruk. Dient alternerend met andere werkingsmechanismen tegen Alternaria toegepast te worden en bij voorkeur producten op basis van mancozeb, zoals bv **Acrobat® Extra WG** (erk. nr 8730P/B - G.H. Lux. : L01445-042) in het schema gebruiken.

Toepassen vanaf de eerste symptomen. Dient altijd toegepast te worden in menging met een specifiek *Phytophthora* middel. Voordurend roeren. Het te mengen product dient erkend te zijn in hetzelfde stadium van het gewas. Oplossen in een hoeveelheid water van 300 – 400 L/ha.

Uiterste gebruikstijdstip vóór de oogst : 3 dagen.

Bufferzone : minimum 1 m met klassieke techniek.

Voorbereiding van de sputioplossing

Verwijder eerst de filter vooraleer het product in het sputitoestel te gieten.

Bijzondere raadgevingen betreffende het gebruik

Om resistentieontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen wordt aangeraden **Terminett®** te alterneren met fungiciden met een ander werkingsmechanisme.

Maximum 1 kg boscalid/ha en per jaar.

Belangrijke opmerkingen

Product bestemd voor beroepsgebruik.

SP1 : zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo : na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de sputivloeistof is opgedroogd.

SPe3 : om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie bufferzone).

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

Lege verpakkingen en sputoverschotten

De zorgvuldig geledige verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van AgriRecover. Raadpleeg desnoeds uw handelaar. De verpakking mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Sputoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om sputoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputivloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking besmetten.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, mindere nadering, meer gevaar voor resistentie, ...).

Bij een groot aantal fungiciden bestaat er een algemeen risico op het optreden van resistente stammen. Om dit risico te verminderen dienen de aanwijzingen voor het gebruik in de gebruiksaanwijzing (dosering, aantal toepassingen, enz.) te worden opgevolgd. Omdat vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van resistentie kan ook bij handhaving van de gebruiksaanwijzing het risico niet worden uitgesloten. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van resistentie.

Waarborg

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Nom commercial / Handelsbenaming : Terminett®

Fongicide / Fungicide

Granulés à disperser dans l'eau / Waterdisperseerbaar granulaat (WG)

Détenteur d'agrément / Erkenningshouder : BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
No. d'agrément / Erkenningsnummer : 9726P/B Usage professionnel / Beroepsgebruik

Substance active / Werkzame stof : **boscalid 26,7 % ; pyraclostrobin 6,7%**

Autres substances dangereuses (% en poids) / Andere gevaarlijke stoffen (gewichts %) : Sodium diisobutylnaphthalenesulphonate <5%; Ammonium sulphate <15%; Silica gel, precipitated, crystalline free <10%; Sodium sulphate <5%.

Mentions de danger / Gevaarsaanduidingen : GHS07 - GHS09 - H302 - H410 - EUH401**Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen**

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P301 P330 P311	EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	NA INSLIKKEN : De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304 P340 P312	EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.	NA INADEMING : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 P362 P352 P332+P313 P363	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	BIJ CONTACT MET DE HUID : Veronreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie : een arts raadplegen. Veronreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305 P351+P338 P337+313	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.	BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichting afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk ; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Remarques pour le médecin / Opmerkingen voor de arts : /

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum : tel. +32 (0)70 245 245 – G.-D. Lux. tel. (+352) 8002 5500

Terminett®



Attention -
Waarschuwing -
Achtung

Terminett®

N° d'agrément : 9726P/B

Usage professionnel

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Contient 26,7 % de boscalid et

6,7 % de pyraclostrobine

Erkenningsnummer : 9726P/B

Beroepsgebruik

Met water dispergeerbaar granulaat (WG)

Bevat 26,7 % boscalid en

6,7 % pyraclostrobin

Zulassungsnummer : 9726P/B

Beruflische Anwendung

Wasserdispersierbares Granulat (WG)

Enthält 26,7 % Boscalid und

6,7 % Pyraclostrobin

5 kg

Mentions de Danger :

- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H410 Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de Prudence (Intervention) :

- P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P330 Rincer la bouche.
P391 Recueillir le produit répandu.

Gevaarsindicaties :

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (Respons) :

- P301 + P312 NA INSLIKKEN : bij onwel voelen een ANTIGFCENTRUM of een arts raadplegen.

81132639 BE 1029

® = Marque déposée BASF
® = Gedeponeerd handelsmerk BASF

- P330 De mond spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gefahrenhinweise :

- EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Reaktion) :

- P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330 Mund ausspülen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Contient :
diisobutyl naphtalènesulfonate de sodium,
N° CAS 27213-90-7

Bevat :
natrium diisobutylnaftaleensulfonaat,
CAS Nr. 27213-90-7


Enthält :
Natriumdiisobutylnaphthalinsulfonat,
CAS Nr. 27213-90-7

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

B.U. Agricultural Solutions
SIEGE D'EXPLOITATION/
EXPLOITATIEZETEL/
OPERATIVE HAUPTSITZ
Bâtiment E-F, Drève Richelle 161 Bte 43
B- 1410 Waterloo
Tel. + 32 (0) 373 27 23

Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer :
Tel. + 32 (0) 3 569 92 32
Centre Antipoisons/Antigifcentrum/
Giftinformationszentrum :
Tel. : +32 (0) 70 245 245

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/
Zulassungsinhaber :
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
SIEGE SÓCIAL/MAATSCHAPPELIKE
ZETEL/
FIRMENSITZ
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen



www.agrirecover.eu